

PRECAUCIONES:

- MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS.
- NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS.
- INUTILIZAR LOS ENVASES VACIOS PARA EVITAR OTROS USOS.
- EN CASO DE INTOXICACION LLEVAR ESTA ETIQUETA AL MEDICO.

MEDIDAS PRECAUTORIAS GENERALES: Evitar el contacto del producto con la piel y los ojos. Durante su preparación y aplicación no comer, beber o fumar. Usar lentes protectores para los ojos, ropa de mangas largas, guantes y botas de goma. Después de la aplicación lavarse bien las manos y partes del cuerpo expuestas al producto con agua y jabón.

RIESGOS AMBIENTALES: **Aves:** Prácticamente no tóxico. **Organismos acuáticos:** Prácticamente no tóxico para peces. **Abejas:** Virtualmente no tóxico.

TRATAMIENTO DE REMANENTES: En caso de que el contenido de este envase sea utilizado parcialmente, el remanente deberá ser almacenado en su envase original bien cerrado, en las condiciones descritas en esta etiqueta. Pulverizar los remanentes del caldo de aplicación sobre terrenos arados, rastrojos no pastoreables o caminos internos.

TRATAMIENTO Y MÉTODO DE DESTRUCCIÓN DE ENVASES VACIOS: Los envases vacíos deben ser totalmente escurridos y descontaminados mediante la técnica del triple lavado. El agua de esta limpieza debe usarse en la preparación del caldo de aplicación. Una vez finalizada esta tarea los envases deben ser inutilizados y guardados en un sector aislado hasta su traslado a una planta de tratamiento para su destrucción.

ALMACENAMIENTO: Mantener el producto en su envase original etiquetado y bien cerrado, en depósitos ventilados y cubiertos, cerrados con candado y fuera del alcance de los niños. No transportar ni almacenar con ropas, alimentos o semillas.

DERRAMES: Inactivar con cal o soda cáustica, recoger con un material absorbente como arena, aserrín, tierra, aglutinante de productos químicos, luego barrer el residuo y colocarlo en recipientes cerrados y bien identificados para ser finalmente remitidos a una planta de tratamiento para su destrucción. Lavar el área y los objetos contaminados con paño húmedo en agua amoniacal o solución de detergente.

PRIMEROS AUXILIOS:

Inhalación: Mover a la víctima fuera del área de exposición y trasladarla hacia un área en donde circule aire fresco. Obtener atención médica.

Contacto dérmico: Lavar inmediatamente con agua y jabón las partes expuestas al producto. Cambiar la ropa contaminada y lavarla antes de reutilizarla.

Contacto ocular: Enjuagar inmediatamente con abundante agua limpia durante por lo menos 15 minutos permaneciendo con los párpados abiertos durante el lavado. Recibir atención médica inmediatamente.

Ingestión: Dar a beber 1 ó 2 vasos de agua. Nunca administrar nada por la boca a una persona que se encuentre inconsciente. Mantener al intoxicado en reposo hasta la llegada del médico. En todos los casos llamar al médico.

ADVERTENCIA PARA EL MEDICO:

Producto ligeramente peligroso. Clase III. Clase inhalatoria III (Cuidado).

LEVE IRRITANTE DERMAL (CUIDADO) CATEGORIA IV.

MODERADO IRRITANTE OCULAR (CUIDADO) CATEGORIA III: Causa irritación moderada a los ojos. No se conoce antídoto específico. Aplicar tratamiento sintomático.

SINTOMAS DE INTOXICACIÓN AGUDA: Náuseas, vómitos, cefalea, malestar estomacal, lagrimeo.

ADVERTENCIAS TOXICOLÓGICAS ESPECIALES: No presenta.

CONSULTAS EN CASOS DE INTOXICACIONES:

- Hospital Pedro de Elizalde: Av. Montes de Oca 40 (C1270AAN) Cap. Fed.,

Tel.: (011) 4300-2115 y 4307-5842

- Hospital de Clínicas José de San Martín: Av. Córdoba 2351 (C1120AAF) Cap. Fed.,

Tel.: (011) 5950-8806/8804

- Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez: Sánchez de Bustamante 1399 (C1425DUA) Cap. Fed., Tel.: (011) 4962-2247/6666

- Centro Nacional de Intoxicaciones Policlínico Posadas: Av. Illía s/n, Palomar, Bs. As.,

Tel.: (011) 4658-7777 / 4654-6648. Conmutador: (011) 4469-9300 internos 1101 al 1103.

Línea gratuita: 0800-333-0160

COMPATIBILIDAD TOXICOLÓGICA: No se ha establecido la ocurrencia de procesos de potenciación, sinergismo o aditividad en mezclas con otros herbicidas.

HERBICIDA

INDIGO ELITE

MICROEMULSION

Composición:

imazetapir: (RS) - 5 - etil - 2 - (4 - isopropil - 4 - metil - 5 - oxo - 2 - imidazolin - 2 - il)	
acido nicotínico.....	4,5 g
solvente y emulsionantes c.s.p.....	100 cm ³

LEA INTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO.

Inscrito en SENASA con el N° 37.734

Industria Argentina

Lote N°:

Contenido Neto:

Fecha de Vencimiento:

INFLAMABLE DE 3ª CATEGORÍA



RED SURCOS S.A.

Av. Freyre N° 2363

(3000) Santa Fe

Prov. de Sta. Fe

Tel/Fax: 0342-4552366

NOTA: No estando el almacenamiento ni su aplicación bajo nuestro control, la firma no acepta ninguna responsabilidad por daños eventuales a personas, animales o cultivos causados por el uso distinto al indicado en esta etiqueta.

GENERALIDADES: INDIGO ELITE es un herbicida postemergente sistémico selectivo y con acción residual para soja. Luego de la aplicación, las malezas susceptibles detienen su crecimiento dejando de competir con el cultivo; la muerte de ellas puede demorar 3 a 4 semanas. Provee además control residual de malezas susceptibles que germinan después de la aplicación. Para obtener un óptimo crecimiento de las malezas, las condiciones de humedad deben ser tales que favorezcan su activo crecimiento. Ocasionalmente, la soja tratada entre el estado de 1° a 3° hoja trifoliada puede mostrar un ligero acortamiento de los entrenudos y amarillamiento de las hojas; no obstante, estos síntomas desaparecen, no afectando los rendimientos en forma adversa.

INSTRUCCIONES PARA EL USO:

PREPARACIÓN:

- Llene la pulverizadora con agua limpia, hasta las 2/3 partes del tanque.

- Con el sistema de agitación en funcionamiento, verter la cantidad recomendada de **INDIGO ELITE** al tanque de la pulverizadora.

- Completar el tanque con agua. Verificar que el sistema de agitación funcione en todo momento. Utilizar siempre agua limpia.

LAVADO DE EQUIPOS

Limpia el equipo utilizado inmediatamente luego de la aplicación. Respetar las siguientes instrucciones: Vaciar completamente el equipo. Enjuagar el tanque, mangueras y picos con agua limpia. Preparar una solución limpiadora de un litro de lavandina cada 200 litros de agua. Usar suficiente cantidad de solución limpiadora como para lavar la totalidad del equipo.

De estar disponible, usar lavadora a presión con la solución limpiadora, para lavar el interior del tanque. Poner en marcha el sistema de agitación y hacer recircular esta solución por al menos 15 minutos. Todos los remanentes visibles deben ser eliminados del equipo de aplicación antes de un nuevo uso, ya que podrían producirse efectos no deseados en los cultivos u áreas tratadas posteriormente. Retirar los picos y pastillas y lavarlos separadamente, después de realizar los pasos precedentes. Eliminar el líquido utilizado en sitios donde no exista riesgo de contaminación de aguas superficiales ni subterráneas.

EQUIPOS, VOLUMENES Y TÉCNICAS DE APLICACIÓN:

Para la aplicación de **INDIGO ELITE** emplear equipos de aspersión a mochila o motorizados, perfectamente calibrados y provistos de agitador. Utilizar sólo el volumen recomendado de producto en los cultivos recomendados.

Aplicación Terrestre: equipo provisto con pastillas de abanico plano. La presión de pulverización debe ser de 2,1 a 3,2 Kg/cm². Volumen de aplicación 150 a 200 litros/ha.

Aplicación aérea: El ancho de la faja de aplicación no debe superar los 14 metros. Se recomienda un volumen de aspersión no menos a 15 l/ha para la región de la Pampa Húmeda y de 20 litros/ha para el Noroeste Argentino.

Se recomienda realizar el tratamiento solo cuando las condiciones de humedad favorezcan el activo desarrollo de las malezas y el viento no exceda los 10 km/ha. Evitar la superposición de la faja de aplicación. No aplicar en horas de máxima insolación.

Para obtener un óptimo control de las malezas, las condiciones de humedad deben ser tales que favorezcan un activo crecimiento de las malezas. Ocasionalmente, la soja tratada entre el estado de 1° a 3° hoja trifoliada puede mostrar un ligero acortamiento de los entrenudos y amarillamiento de las hojas; no obstante, estos síntomas desaparecen, no afectando los rendimientos en forma adversa.

RECOMENDACIONES DE USO:

CULTIVO	MALEZAS	DOSIS	MOMENTO DE APLICACIÓN
Soja	Pasto Cuarema (Digitaria sanguinalis) Brachiaria (Brachiaria plantaginae) Quinoa (Chenopodium album) Sorgo de Alepo (Sorghum halepense) Sorgo Bicolor (Sorghum bicolor)	0,4 l/Ha	En post emergencia temprana (soja de 15 a 20 cm de altura).

RESTRICCIONES DE USO: Entre la última aplicación y la cosecha, deben dejarse transcurrir 90 días en Soja. En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberán conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el periodo de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.

Tiempo de reingreso al área tratada: No reingresar al área tratada hasta que el producto se haya secado de la superficie de las hojas.

COMPATIBILIDAD: INDIGO ELITE es compatible con otros productos fitosanitarios. Consultar con un Ingeniero Agrónomo antes de realizar las mezclas.

FITOTOXICIDAD: INDIGO ELITE no es fitotóxico aplicando las dosis recomendadas. En la aplicación en el cultivo de soja entre el 1° y 3° hoja trifoliada, puede aparecer un ligero acortamiento de entrenudos y amarillamiento que no afecta el rendimiento.

AVISO DE CONSULTA TÉCNICA: CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO.



CUIDADO

