



[www.redsurcos.com](http://www.redsurcos.com)

Lima 355 2º, Piso "A" (C1073AAG) Buenos Aires, Argentina.  
Tel.: (011) 4382-7766 | e-mail: [info@redsurcos.com](mailto:info@redsurcos.com)



# Ricefop

Herbicida para el cultivo de arroz





El arroz, es el grano alimenticio de importancia fundamental para mas de la mitad de la población mundial y sin duda, continuará siendo su fuente primaria de alimentación en el futuro.

La producción en gran escala del cultivo de arroz requiere de una importante aplicación de tecnología y desarrollo de nuevas soluciones para nuevos problemas.

Red Surcos presenta con RICEFOP una alternativa de control de malezas problemáticas que permite potenciar los rendimientos de este cultivo.

## Herbicida para el cultivo de arroz

OTRO PRODUCTO DESARROLLADO POR RED SURCOS

RICEFOP es un herbicida sistémico, selectivo y de aplicación post emergente que controla malezas gramíneas en el cultivo de arroz de inundación y secano.

El arroz lo metaboliza a moléculas inactivas mientras que las especies de Echinochloa lo metabolizan a sustancias con actividad herbicida.

Es eficaz contra biotipos de Echinochloa resistentes a herbicidas de uso común.

Se absorbe rápidamente a través del follaje y se transloca a los tejidos meristemáticos de la planta donde ejerce su acción herbicida.

Detiene el crecimiento de las malezas a las pocas horas de aplicación.

En los suelos, tanto inundados como drenados, se metaboliza rápidamente, siendo su vida media de 1- 4 días y de 2 días en el agua; en algunos suelos aerobios es inferior a 2 horas.

### FICHA TECNICA

COMPOSICIÓN  
CYHALOFOP BUTIL 18%

PRESENTACIÓN  
BIDONES X 20 LTS.

CLASIFICACIÓN QUÍMICA  
ARILOXIFENOXIPROPIONATO

ACCIÓN  
SISTÉMICA

GRADO DE TOXICIDAD  
CLASE IV  
MECANISMO DE ACCIÓN  
Inhibidores de la Acetil Co-A



## BENEFICIOS Ricefop

- EXCELENTE ACTIVIDAD POSTEMERGENTE Y RESIDUAL SOBRE ESPECIES DEL GÉNERO ECHINOCHLOA.
- AMPLIA FLEXIBILIDAD DE USO PARA DIFERENTES SISTEMAS DE SIEMBRAS Y MANEJO DEL CULTIVO DE ARROZ.
- RÁPIDA ACCIÓN A LOS POCOS DÍAS DE APLICACIÓN.
- EXCELENTE FLEXIBILIDAD EN ROTACIONES.
- EXCELENTE PERFIL TOXICOLÓGICO PARA HUMANOS Y MEDIO AMBIENTE.
- PUEDE APLICARSE EN FORMA TERRESTRE Y AÉREA.
- NO PRODUCE FITOTOXICIDAD.



### MALEZAS QUE CONTROLA

| CULTIVO | MALEZAS                  | DOSIS (LS/HA) | ESTADO DE CRECIMIENTO DE LA MALEZA |
|---------|--------------------------|---------------|------------------------------------|
| Arroz   | Capín (Echinochloa spp.) | 1.5 - 2       | 3 hojas hasta 1-2 macollos.        |

**Red Surcos**  
Una empresa de *tu tierra*

### RECOMENDACIONES:

No se debe aplicar cuando haya transcurrido una sequía prolongada, ni con incidencia solar elevada o altas temperaturas.

Aplicar cuando las gramíneas están en activo crecimiento (malezas con 3 hojas verdaderas y hasta un macollo). Para un control más efectivo, se debe proceder a inundar definitivamente el cultivo a las 24 horas posteriores a la aplicación del producto.

Agregar siempre aceite metilado de soja: POWEROIL a razón de 1 % v/v en aplicaciones terrestres (1 lt cada 100 lts de agua) o 1 a 1,5 lts en aplicaciones aéreas. Usar las dosis más elevadas en situaciones de baja humedad ambiente.

Compatibilidad :En caso de duda se recomienda realizar pruebas previas de compatibilidad. NO se recomienda su mezcla con productos altamente alcalinos.

Fitotoxicidad: No se han observado efectos fitotóxicos bajo las recomendaciones de uso, sin embargo se recomiendan pruebas previas en nuevas variedades de cultivo.

### INSTRUCCIONES PARA EL USO:

- Llenar el tanque del equipo en su totalidad con agua limpia (utilizar filtros).
- Poner en funcionamiento el sistema de retorno del equipo y agregar RICEFOP al tanque.
- Una vez emulsionado el herbicida en el tanque, agregar POWEROIL en el caldo a razón de 1 % v/v (1 litro de aceite cada 100 litros de caldo) en aplicaciones terrestres y de 1 a 1,5 litros por hectárea para aplicaciones aéreas.

Es importante que el sistema de retorno funcione en todo momento.

Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación:

Las aplicaciones pueden realizarse con equipos terrestres o aéreos.

Aplicaciones terrestres: usar equipos de alto volumen. Pastillas abanico plano, que aseguren la cobertura del área tratada. Volumen: 60-80 litros

Aplicaciones aéreas: volumen: 25-40 litros/ha.