PRECAUCIONES:
- **MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS.**
- **NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS.**
- **INUTILIZAR LOS ENVASES VACIOS PARA EVITAR OTROS USOS.**
- **EN CASO DE INTOXICACION LLEVAR ESTA ETIQUETA AL MEDICO.**
- **EL PRESENTE PRODUCTO DEBE SER COMERCIALIZADO Y APLICADO DANDO CUMPLIMIENTO A LAS NORMATIVAS PROVINCIALES Y MUNICIPALES VIGENTES.**
- **PELIGRO. SU USO INCORRECTO PUEDE PROVOCAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE. LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA.**

MEDIDAS PRECAUTORIAS GENERALES: No debe ingerirse ni inhalarse. Evitar el contacto con la piel, ojos y ropas. Luego de la aplicación, lavarse con agua y jabón las partes expuestas al contacto del producto. Durante la preparación y aplicación, usar ropa protectora adecuada, botas y guantes de goma, máscara y antiparras o anteojos con protección lateral. Lavar el equipo de pulverización repetidas veces con abundante agua limpia y lavandina luego de cada aplicación. No contaminar fuentes de agua ni enjuagar el equipo pulverizador en cercanía de árboles o plantas en general.

RIESGOS AMBIENTALES:
ABEJAS: Virtualmente no tóxico.
AVES: Prácticamente no tóxico.
ORGANISMOS ACUATICOS: Prácticamente no tóxico.

TRATAMIENTO DE REMANENTES Y CALDOS DE APLICACION: En caso de que el contenido de este envase sea utilizado parcialmente, el remanente deberá ser almacenado en su envase original bien cerrado, en las condiciones descriptas en esta etiqueta.
Asimismo, los remanentes del producto sin diluir pueden mezclarse con agua, en una concentración del 1 al 3 %, y aplicarse sobre alambrados y zonas no cultivadas donde se quiera eliminar malezas. El remanente de la pulverización puede eliminarse del mismo modo, sin necesidad de dilución.

TRATAMIENTO Y MÉTODO DE DESTRUCCIÓN DE ENVASES VACIOS: Verificar que estén vacíos. Los envases vacíos deben ser totalmente escurridos y descontaminados mediante la técnica del triple lavado. Para esto se deberá llenar el envase vacío con una cuarta parte de su volumen total, se ajustará el tapón y se sacudirá enérgicamente durante 20 o 30 segundos. Esta operación deberá repetirse al menos otras 2 veces. El agua de esta limpieza debe verterse en la pulverizadora, antes de su aplicación. Una vez finalizada esta tarea los envases deben ser inutilizados y guardados en un sector aislado hasta su traslado a una planta de tratamiento para su destrucción.
NO QUEMAR A CIELO ABIERTO.

ALMACENAMIENTO: Conservar el producto en su envase original, rotulado y bien cerrado, en lugar seco y fresco; apartándolo de forrajes, semillas y alimentos.

DERRAMES: En caso de derrame absorber con arena u otro material inerte. Barrer y recoger el producto en un contenedor bien identificado para ser luego transportado a una planta de tratamiento para su destrucción.

PRIMEROS AUXILIOS:
Inhalación: Salir al aire libre. En el caso de molestias prolongadas acudir a un médico. Mantener al paciente en reposo y abrigado.
Contacto dérmico: Lavar con abundante agua y jabón las partes expuestas al producto. Cambiar la ropa contaminada y lavarla antes de reutilizarla.
Contacto ocular: Lavar con agua corriente y limpia por lo menos durante 15 minutos manteniendo los párpados bien abiertos.
Ingestión: Acudir de inmediato al médico para que decida el procedimiento de desintoxicación adecuado de acuerdo con el diagnóstico que cada caso requiere. Nunca suministrar nada por la boca a una persona que se encuentre inconsciente. Mantener al paciente en reposo hasta la llegada del médico.
EN TODOS LOS CASOS PROCURAR ASISTENCIA MÉDICA.

ADVERTENCIA PARA EL MEDICO:
PRODUCTO LIGERAMENTE PELIGROSO (CLASE III). CATEGORIA INHALATORIA III (CUIDADO).MODERADO IRRITANTE OCULAR (CUIDADO) CATEGORIA III: Causa irritación moderada en los ojos. Está contraindicada la antropina.

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN AGUDA: Náusea, vómitos, diarrea, dolor abdominal, temblores, hipotensión, taquicardia, debilidad muscular, inconsciencia, convulsiones, coma, insuficiencia respiratoria, los síntomas pueden retrasarse.

ADVERTENCIAS TOXICOLOGICAS ESPECIALES: No presenta.

CONSULTAS EN CASOS DE INTOXICACIONES:
- Unidad Toxicológica del Hospital General de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez.
Tel.: (011) 4962-6666 y 4962-2247
- Centro Nacional de Intoxicaciones Policlínico Posadas - Haedo -
Tel.: (011) 4654-6648 y 4658-7777 Conmutador: (011) 4469-9300
internos 1101 al 1103. Línea gratuita: 0800-333-0160
- Centro Toxicológico del Hospital de Clínicas J. de San Martín - Buenos Aires -
Tel.: (011) 5950-8804 y 5950-8806
- Centro de Consultas Toxicológicas CASAFE. Llamar a TAS durante las 24 hs. Tel.: (0341) 424-2727

COMPATIBILIDAD TOXICOLOGICA: Es compatible con los herbicidas residuales a base de alaclor, atrazina, diuron, linuron y simazina.

HERBICIDA
GRUPO: H

TIMON

CONCENTRADO SOLUBLE

Composición:

glufosinato de amonio: DL-homoalanin-4-il(metil)fosfinato de amonio	20 g
emulsionantes y solventes c.s.p.....	100 cm^3

LEA INTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO.

Inscripto en SENASA con el Nº 37.995

Industria Argentina Lote Nº:

Contenido Neto: Fecha de Vencimiento:

INFLAMABLE DE 2da CATEGORIA

RED SURCOS S.A.
Av. Freyre Nº 2363
(3000) Santa Fe
Prov. de Sta. Fe
Tel/Fax: 0342-4552366

NOTA: Red Surcos S.A. no se responsabiliza por los daños y perjuicios de cualquier naturaleza que se deriven del uso incorrecto de este producto, diferente del indicado en esta etiqueta, ya que su aplicación se efectuará fuera del control del vendedor, empleando técnicas particulares y en condiciones ambientales variables. Red Surcos S.A. garantiza la calidad del producto hasta la fecha de vencimiento indicada, siempre que se mantenga en su envase original inviolado y almacenado en locales adecuados que sean secos, bien aireados y al resguardo de la luz solar.

GENERALIDADES: TIMON es un herbicida post emergente selectivo en aplicaciones de cobertura total solamente sobre maíces que indiquen la posibilidad de dicho uso en los rótulos y en las bolsas de semillas hibridas de maíz resistentes a glufosinato de amonio y no selectivo para el control de malezas anuales, gramíneas y de hoja ancha, para cultivos, frutales y vides. También es factible su uso en barbechos químicos, bordes de caminos, orillas de canales y de acequias (alejado de viviendas, centros poblados o lugares de tránsito frecuente de personas. Tener en cuenta las medidas de mitigación para no contaminar fuentes de aguas), entre hileras de cultivos anuales, y previo a la emergencia de cultivos, puesto que se inactiva inmediatamente al entrar en contacto con el suelo. Su modo de acción es de contacto con cierta acción sistémica. El transporte ocurre solamente entre las hojas, predominantemente de las inferiores a las superiores. Actúa neutralizando la síntesis de glutamina, acumulándose amoniaco y al mismo tiempo inhibiendo la fotosíntesis.
El primer síntoma de la acción de **TIMON** es el amarillamiento claro que adquieren las partes verdes de las plantas, luego se marchitan y mueren a los 2-5 días.

INSTRUCCIONES PARA EL USO:
PREPARACION: TIMON es un concentrado soluble en agua. Para una correcta preparación, respetar las siguientes instrucciones:

-Agregar agua limpia al tanque de la pulverizadora hasta la mitad.
-Poner en funcionamiento el sistema de agitación.
-Agregar la cantidad necesaria de TIMON según la calibración realizada, sin dilución previa.
-Verificar que el producto se disuelva completamente y completar el tanque con agua hasta el volumen final.
-Mantener en todo momento el sistema de agitación
-Utilizar el producto dentro de las 24 horas de haber realizado la mezcla.

LAVADO DE EQUIPOS
Limpiar el equipo utilizado inmediatamente luego de la aplicación. Respetar las siguientes instrucciones: Vaciar completamente el equipo. Enjuagar el tanque, mangueras y picos con agua limpia. Preparar una solución limpiadora de un litro de lavandina cada 200 litros de agua. Usar suficiente cantidad de solución limpiadora como para lavar la totalidad del equipo.
De estar disponible, usar lavadora a presión con la solución limpiadora, para lavar el interior del tanque. Poner en marcha el sistema de agitación y hacer recircular esta solución por al menos 15 minutos. Todos los remanentes visibles deben ser eliminados del equipo de aplicación antes de un nuevo uso, ya que podrían producirse efectos no deseados en los cultivos u áreas tratadas posteriormente. Retirar los picos y pastillas y lavarlos separadamente, después de realizar los pasos precedentes. Eliminar el líquido utilizado en sitios donde no exista riesgo de contaminación de aguas superficiales ni subterráneas.

EQUIPOS, VOLÚMENES Y TÉCNICAS DE APLICACION:
Los equipos pulverizadores utilizados deben asegurar una cobertura uniforme de las hojas de las malezas con TIMON.
En el cultivo de maíz aplicar volúmenes de 100 a 150 l de agua por hectárea, con una presión de 40 a 70 libras/pulgada usando pastillas abanico plano 8002, 8003, 11002 y 11003; para lograr 40 – 50 gotas/ cm2.
Evitar realizar las aplicaciones en las horas de máximo calor. No se produce lavado por lluvia después de un período de 6 horas de aplicado el producto.

Antes de iniciar cualquier tratamiento, es indispensable verificar el correcto calibrado del equipo y buen funcionamiento de picos (filtros y boquillas), reemplazando las partes defectuosas. Mantener el sistema de agitación en movimiento en todo momento. No es conveniente realizar la aplicación cuando las malezas estén sufriendo stress hídrico, deficiencia nutricional, o bajo la ocurrencia de heladas o ataques de plagas. Suspender las aplicaciones con vientos superiores a los 10 km/hora. Evitar la superposición de franjas durante la pulverización.
RECOMENDACIONES DE USO:

CULTIVO	MALEZA	DOSIS	MOMENTO DE APLICACIÓN
Maíz LL (resistente al glufosinato de amonio en estado de 3 a 4 hojas)	Abrojo grande (Xanthium cavanillessi) Amor seco (Bidens pilosa) Bejucos (Ipomoea spp.) Capin arroz (Echinochloa crus-galli), Chamico (Datura Ferox) Chinchilla (Tagetes bonariensis) Lagunilla (Alternanthera philoxeroides) Pasto braquiaria (Brachiaria extensa) Pasto de cuaresma (Digitaria sanguinalis) Pie de gallina (Eleusine indica) Quinoa blanca (Chenopodium album) Sorgo de Alepo de semilla (Sorghum halepense) Verdolaga (Portulaca oleracea) Yuyo Colorado (Amaranthus quitensis) Malva cimarrona (Anoda cristata)	1.5 – 2 l/ha + Sulfato de amonio 1% v/v.	Cuando el cultivo tiene de 3 a 4 hojas. Emplear las dosis mas bajas en los primeros estadios vegetativos de las malezas latifoliadas (2-4 hojas) y al comienzo del macollaje en gramíneas. Las dosis más altas para aquellas de mayor tamaño. En el Sorgo de Alepo de rizoma, aplicar cuando la maleza está en estadios vegetativos de 2-6 hojas.
	Sorgo de Alepo de rizoma (Sorghum halepense)	2,5 – 3,5 l/ha + Sulfato de amonio 1% v/v.	
Área sin cultivo Frutales	Abrojo grande (*Xanthuim cavanillesii*) Albahaca silvestre (*Galinsoga parviflora*) Avena guacha (*avena fatua*) Bolsa del pastor (*Capsella bursa pastoris*) Capin arroz (*Echinochloa crus-galli*) Capiqui (*Stellaria media*) Cardo Ruso (*Salsola kali*) Cebadilla (*Bromus mollis*) Cebadilla chaqueña (*Bromus auleticus*) Cebadilla criolla (*Bromus catharticus*) Cerraja (*Sonchus oleraceus*) Chamico (*Datura ferox*) Cola de zorro (*Setaria viridis*) Enredadera anual (*Poñygonum convolvulus*) Flor del pajarito (*Fumaria agraria*) Hierba cana (*Senecio vulgaris*) Maiz guacho (*Zea mays*) Manzanilla (*Matricaria chamonilla*) Morenita (*Kochia scoparia*) Nabon (*Paphanus sativus*) Ortiga (*Urtica urens*) Pasto de cuaresma (*Digitaria sanguinalis*) Poa (*Poa annua*) Quinoa Blanca (*Chenopodium album*) Ryegrass (*Lolium multiflorum*) Trebol de olor blanco (*Melilotus albus*) Trigo guacho (*Triticum spp.*) Yuyo colorado (*Amaranthus albus*)	2,5 – 5 l/ha	Cuando comienza el estado de desarrollo vegetativo de las latifoliadas o al comienzo del macollaje de las gramíneas.
	Agropiro invasor, Grama (*Elytrigia repens*) Algarrobilla fina (*Hoffmanseggia falcaria*) Cebollin (*Cyperus rotundus*) Chufa salvaje (*Cyperus esculentus*) Correguela (*Convolvulus arvensis*) Gramilla dulce (*Paspalum distichum*) Gramon (*Cynodon dactylon*) Lengua de vaca (*Rumex crispus*) Sorgo de alepo (Sorghum haepense) Trebol Blanco (Trifolium repens)	5-8 l/ha	

RESTRICCIONES DE USO: Posee uso posicionado en maíz transgénico para grano consumo. Para forraje fresco dejar pasar 35 días entre aplicación y cosecha de grano.
En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberán conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.
Tiempo de reingreso al área tratada: 12 horas.

COMPATIBILIDAD: TIMON es compatible con los herbicidas residuales a base de alaclor, atrazina, diuron, linuron y simazina. Los usos compatibles deberán estar autorizados para los mismos usos recomendados.

FITOTOXICIDAD: A las dosis y momentos de aplicación indicados, **TIMON** no es fitotóxico para los cultivos recomendados.

AVISO DE CONSULTA TECNICA:. CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO.



CUIDADO



CUIDADO